ESTRUTURA ATÔMICA E TABELA PERIÓDICA

CONCURSEIRO ZERO1 BY ENGEMARINHA

charlene.hair@gmail.com
00412071061

ÍNDICE

ESTRUTURA ATÔMICA E TABELA PERIÓDICA.....3
Estrutura do Átomo.....3
Modelos e Partículas Fundamentais.....3
A Evolução dos Modelos Atômicos.....4
Para Memorizar:.....11
Para Memorizar:.....12
Como isso cai na prova?.....14
Partículas Subatômicas e Conceitos Fundamentais.....15
Para Memorizar:.....16
Para Memorizar:.....16
Como isso cai na prova?.....18
A ELETROSFERA E A DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA.....20
Níveis, Subníveis e o Diagrama de Linus Pauling.....20
Números Quânticos.....24
Como isso cai na prova?.....27
TABELA PERIÓDICA: ORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO.....29
Estrutura e Organização.....29
Para Memorizar:.....33
Classificação dos Elementos.....34
Como isso cai na prova?.....37
PROPRIEDADES PERIÓDICAS DOS ELEMENTOS.....39
Variação das Propriedades.....39
Para Memorizar:.....44
Como isso cai na prova?.....45
Considerações Finais.....52

charlene.hair@gmail.com
00412071061

ESTRUTURA ATÔMICA E TABELA PERIÓDICA

Estrutura do Átomo

Modelos e Partículas Fundamentais

A compreensão da estrutura da matéria representa um dos pilares mais essenciais da Química, constituindo o alicerce sobre o qual todos os conceitos subsequentes desta ciência são construídos. É no nível atômico que encontramos as respostas para perguntas fundamentais: Por que um diamante é tão duro? O que permite a um fio de cobre conduzir eletricidade? De onde vêm as cores vibrantes dos fogos de artifício? A resposta para todas essas questões reside na organização interna dos átomos.

O átomo, definido como a menor unidade da matéria que preserva as propriedades químicas de um elemento, foi, por milênios, uma ideia abstrata. Partindo das concepções filosóficas dos gregos antigos, a busca por sua real natureza nos levou a uma jornada científica extraordinária.

Esta saga, marcada pela evolução de modelos teóricos, foi impulsionada por gigantes como Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e Schrödinger. Cada um, construindo sobre os ombros do anterior, adicionou uma nova peça ao complexo quebra-cabeça da estrutura atômica, transformando uma esfera indivisível em uma complexa nuvem de probabilidades.

Essa transição não foi um mero exercício de imaginação, mas sim o resultado de experimentos engenhosos, observações meticulosas e saltos teóricos audaciosos. Da descoberta do elétron à proposição de um núcleo denso e positivo, e mais tarde à quantização dos níveis de energia, cada avanço não apenas invalidou partes do modelo anterior, mas também abria portas para uma compreensão mais profunda e precisa do universo.

Neste capítulo, embarcaremos nesta jornada histórica e conceitual. Primeiro, exploraremos a cronologia dos modelos atômicos, entendendo as evidências experimentais que levaram a cada nova teoria. Em seguida, mergulharemos nos

charlene.hair@gmail.com
00412071061

componentes fundamentais do átomo moderno — os prótons, nêutrons e elétrons — e aprenderemos a quantificar suas relações através de conceitos-chave como o número atômico (Z) e o número de massa (A), estabelecendo a base sólida necessária para desvendar os segredos da Tabela Periódica.

A Evolução dos Modelos Atômicos

A busca por compreender a natureza última da matéria remonta à antiguidade, mas foi somente no **século XIX** que surgiram os primeiros modelos científicos baseados em evidências experimentais. Esta evolução representa uma das mais elegantes demonstrações de como a ciência progride, com cada modelo superando as limitações do anterior enquanto preserva seus acertos.

O primeiro modelo com fundamentação científica sólida foi proposto por **John Dalton em 1808**, concebendo o átomo como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, análoga a uma **bola de bilhar**.



John Dalton (1766 - 1844)

Este modelo, embora simples, representou uma revolução conceitual ao postular que átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa e propriedades, enquanto átomos de elementos diferentes possuem massas distintas. Dalton também estabeleceu que as reações químicas consistem simplesmente em rearranjos desses átomos indivisíveis.



"O modelo atômico de Dalton conhecido como “bola de bilhar”.

Pensando na elegância deste modelo, é notável como Dalton conseguiu explicar as leis ponderais da química – como a Lei da Conservação da Massa de Lavoisier – através dessa concepção atomística. O átomo como "bola de bilhar" fornecia uma imagem mental clara e uma explicação mecânica para os fenômenos químicos observados.

Contudo, as descobertas do final do **século XIX** revelaram que o átomo não era indivisível. Em **1898, J.J. Thomson**, após descobrir o elétron, propôs um modelo radicalmente diferente.



J.J. Thomson (1856 - 1940)

Para Thomson, o átomo seria uma esfera de carga positiva uniformemente distribuída, com os elétrons de carga negativa incrustados nesta matriz, garantindo a neutralidade elétrica do conjunto. Este modelo ficou popularmente conhecido como **pudim de passas**, uma analogia que facilita a visualização dessa estrutura.



"O modelo atômico de Thomson"

O modelo de Thomson representou um avanço significativo por reconhecer a divisibilidade do átomo e a existência de partículas subatômicas. Ele conseguia explicar a formação de íons pela perda ou ganho de elétrons e oferecia uma interpretação para os raios catódicos descobertos em tubos de descarga gasosa.

A grande revolução chegou com **Ernest Rutherford em 1911**. Seu famoso experimento, bombardeando uma fina lâmina de ouro com partículas alfa, revelou resultados surpreendentes que contradiziam completamente o modelo de Thomson.

A observação de que algumas partículas alfa eram desviadas em ângulos muito grandes, e até mesmo refletidas, levou Rutherford a uma conclusão revolucionária: **o átomo não era uma estrutura maciça uniforme.**



Ernest Rutherford (1871 - 1937)

Rutherford propôs então o **modelo nuclear ou planetário**, no qual o átomo possuiria um núcleo extremamente pequeno, denso e de carga positiva, concentrando praticamente toda a massa atômica. Ao redor deste núcleo, numa vasta região periférica chamada eletrosfera, os elétrons orbitavam em trajetórias semelhantes às dos planetas ao redor do Sol.

Este modelo explicava perfeitamente os resultados experimentais: a maioria das partículas alfa atravessava o átomo sem desvio porque a maior parte do espaço atômico estava vazia, enquanto os poucos desvios e reflexões ocorriam quando as partículas se aproximavam do núcleo denso.



"O modelo atômico de Rutherford"

Apesar de sua elegância e poder explicativo, o modelo de Rutherford apresentava uma inconsistência fundamental com a física clássica. Segundo as leis do eletromagnetismo, uma carga elétrica em movimento acelerado deveria irradiar energia continuamente, fazendo com que os elétrons perdessem energia e 'espiralassem' em direção ao núcleo até colapsar. O átomo seria, portanto, instável – uma previsão que claramente contradiz a realidade.

Para resolver essa inconsistência, **Niels Bohr, em 1913**, propôs um modelo revolucionário que combinava a estrutura nuclear de Rutherford com os princípios da física quântica nascente.



Niels Bohr (1885 - 1962)

O **modelo de Rutherford-Bohr** postulou que os elétrons se movem em órbitas circulares bem definidas, cada uma correspondendo a um **nível específico de energia**. A genialidade de Bohr foi propor que, nessas órbitas permitidas, os elétrons não irradiariam energia espontaneamente, mantendo-se estáveis.



"O modelo atômico de Bohr"

Segundo Bohr, os elétrons poderiam "saltar" de uma órbita para outra de maior energia ao absorver uma quantidade específica de energia, retornando posteriormente à órbita original e emitindo essa energia na forma de luz.

Este modelo não apenas explicava a estabilidade atômica, mas também fornecia uma interpretação elegante para os espectros de emissão dos elementos, onde cada linha espectral correspondia à transição entre níveis de energia específicos.

charlene.hair@gmail.com
00412071061

O **modelo atômico atual**, desenvolvido a partir de **1926** com as contribuições fundamentais de **Erwin Schrödinger** e **Werner Heisenberg**, representa a síntese mais sofisticada de nossa compreensão atômica.



Erwin Schrödinger (1887 - 1961)

Este **modelo quântico** abandona completamente a ideia de órbitas precisas e bem definidas, reconhecendo que o comportamento das partículas subatômicas não pode ser descrito adequadamente pela mecânica clássica.



"O modelo atômico de Schrödinger"

O conceito central do modelo quântico é o **orbital**, que representa a região do espaço ao redor do núcleo onde existe a maior probabilidade de encontrar um elétron. Em vez de trajetórias definidas, temos **nuvens de probabilidade** que

descrevem o comportamento dual onda-partícula do elétron. Esta descrição probabilística não reflete uma limitação de nosso conhecimento, mas sim a natureza fundamental da realidade quântica.

Para Memorizar:

Evolução dos modelos atômicos

Os modelos atômicos foram propostos por diversos cientistas ao longo do tempo, cada um contribuindo para a compreensão da estrutura e comportamento do átomo.

Os principais modelos são: Dalton (bola de bilhar), Thomson (pudim de passas), Rutherford (nuclear), Bohr (planetário) e Modelo de Schrödinger. Representam uma progressão na nossa compreensão da estrutura atômica:



Para Memorizar:

1. **Modelo de Dalton (1808): A Bola de Bilhar**
    - Proposto por **John Dalton**, este foi o primeiro modelo com fundamentação científica sólida.
    - Concebia o átomo como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível.
    - **Postulados principais:**
        - Átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa e propriedades.
        - Átomos de elementos diferentes possuem massas distintas.
        - Reações químicas são rearranjos de átomos indivisíveis.
    - Este modelo foi crucial para explicar as leis ponderais da química, como a Lei da Conservação da Massa de Lavoisier.

2. **Modelo de Thomson (1898): O Pudim de Passas**
    - Proposto por **J.J. Thomson** após a descoberta do elétron.
    - Descrevia o átomo como uma esfera de carga positiva uniforme, com elétrons de carga negativa incrustados, garantindo a neutralidade elétrica.
    - **Avanços:**
        - Reconheceu a divisibilidade do átomo e a existência de partículas subatômicas.
        - Explicava a formação de íons e os raios catódicos.

3. **Modelo de Rutherford (1911): O Modelo Nuclear ou Planetário**
    - Desenvolvido por **Ernest Rutherford** a partir de seu famoso experimento com a lâmina de ouro.
    - Conclusão revolucionária: o átomo não é uma estrutura maciça.
    - **Estrutura proposta:**
        - Um núcleo extremamente pequeno, denso e de carga positiva, concentrando quase toda a massa.
        - Uma eletrosfera, vasta região periférica onde os elétrons orbitariam o núcleo.
    - **Inconsistência**: Segundo a física clássica, os elétrons em movimento deveriam irradiar energia, colapsando no núcleo, o que não ocorre.

4. **Modelo de Rutherford-Bohr (1913): As Órbitas Estacionárias**
    - Proposto por **Niels Bohr** para resolver a inconsistência do modelo de Rutherford.
    - Combinava o modelo nuclear com os primórdios da física quântica.
    - **Postulados:**
        - Elétrons movem-se em órbitas circulares definidas, cada uma com um nível específico de energia.
        - Nessas órbitas permitidas, os elétrons não irradiam energia e permanecem estáveis.
        - Elétrons podem "saltar" para órbitas de maior energia ao absorverem uma quantidade específica de energia e retornam emitindo luz, o que explica os espectros de emissão.

5. **Modelo Quântico (a partir de 1926): A Nuvem de Probabilidade**
    - Desenvolvido com as contribuições de **Erwin Schrödinger** e **Werner Heisenberg**.
    - Abandona a ideia de órbitas precisas.
    - **Conceito central:** o orbital, que é a região do espaço ao redor do núcleo onde existe a maior probabilidade de encontrar um elétron.
    - Introduz as nuvens de probabilidade para descrever o comportamento dual onda-partícula do elétron.

Evolução dos Modelos Atômicos



Como isso cai na prova?

As bancas de concurso frequentemente cobram as características de cada modelo atômico e a evolução do pensamento científico. É comum encontrar questões que pedem para associar o cientista ao seu modelo ou para identificar a principal contribuição ou falha de cada teoria. Questões de "certo ou errado" sobre as características de cada modelo (ex: "O modelo de Dalton previa a existência de elétrons") são muito populares.

Questões

1. (Questão Inédita) O modelo atômico de Rutherford, apesar de seu grande avanço ao propor a existência de um núcleo denso e positivo, apresentava uma inconsistência fundamental com a física clássica. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente essa inconsistência?

a) O modelo não conseguia explicar por que os elétrons não se chocavam, já que todos possuíam cargas negativas.
b) O modelo sugeria que o átomo era maciço e indivisível, o que foi contrariado por experimentos posteriores.
c) Segundo as leis do eletromagnetismo, um elétron em órbita deveria irradiar energia continuamente, perdendo velocidade e caindo em espiral até o núcleo.
d) O modelo não previa a existência de nêutrons no núcleo para estabilizar os prótons.

Resposta: Letra C

2. (Questão Inédita) Assinale a alternativa que associa corretamente o cientista ao conceito fundamental introduzido por seu modelo atômico.

a) John Dalton - A existência de partículas subatômicas com carga.
b) J.J. Thomson - A ideia de um núcleo atômico e a eletrosfera.
c) Niels Bohr - A quantização da energia dos elétrons em níveis definidos.
d) Erwin Schrödinger - O átomo como uma esfera maciça e indivisível.

Resposta: Letra C

Partículas Subatômicas e Conceitos Fundamentais

A estrutura atômica moderna reconhece a existência de duas regiões fundamentais:

- **Núcleo Central:** Extremamente pequeno, mas contendo praticamente toda a massa.
- **Eletrosfera:** Região vasta onde os elétrons se distribuem distribuem em padrões probabilísticos complexos.

O núcleo atômico, descoberto por Rutherford, concentra uma densidade extraordinária de matéria num espaço infinitesimal. Para compreender essa escala, imagine que se pudéssemos ampliar um átomo até o tamanho de um estádio de futebol: o núcleo seria aproximadamente do tamanho de uma ervilha no centro do campo. Este núcleo contém dois tipos de partículas fundamentais: os **prótons** e os **nêutrons**.

Os **prótons** são partículas portadoras de **carga elétrica positiva**, convencionalmente representada como **+1**, e possuem **massa relativa de aproximadamente 1 unidade de massa atômica (u.m.a.)**. O que torna os prótons absolutamente especiais é que seu número define inequivocamente a identidade de um elemento químico. Este número de prótons presente no núcleo é chamado de **Número Atômico**, simbolizado pela letra **Z**, e constitui verdadeiramente a "impressão digital" de cada elemento.

Pense na elegância desta definição: todos os átomos que possuem exatamente 6 prótons são átomos de carbono, independentemente de qualquer outra característica. Átomos com 8 prótons são sempre oxigênio, aqueles com 26 prótons são sempre ferro. O Número Atômico não apenas identifica o elemento, mas também determina sua posição na Tabela Periódica e suas propriedades químicas fundamentais.

Ao lado dos prótons, encontramos os **nêutrons**, partículas **eletricamente neutras** (daí seu nome) com **massa praticamente idêntica à dos prótons**. Os

nêutrons desempenham um papel crucial na estabilidade nuclear, atuando como uma espécie de "cola nuclear" que mantém os prótons unidos apesar da repulsão elétrica entre suas cargas positivas.

Para Memorizar:

- **Prótons:**
  - Partículas com carga elétrica positiva (+1).
  - Possuem massa relativa de aproximadamente 1 unidade de massa atômica (u.m.a.).
  - O número de prótons, chamado de Número Atômico (Z), define a identidade de um elemento químico.
- **Nêutrons:**
  - Partículas eletricamente neutras.
  - Possuem massa praticamente idêntica à dos prótons.
  - Atuam como uma "cola nuclear", garantindo a estabilidade do núcleo.

A **soma do número de prótons e nêutrons** resulta no **Número de Massa**, representado pela letra **A**, que indica a massa total do núcleo atômico. A relação **A = Z + n** (onde n é o número de nêutrons) nos permite calcular facilmente qualquer uma dessas grandezas quando conhecemos as outras duas.

Na eletrosfera, região que circunda o núcleo, encontramos os **elétrons**, partículas de **carga elétrica negativa (-1)** e **massa desprezível** em comparação com prótons e nêutrons – aproximadamente 1/1836 da massa de um próton. Esta massa ínfima dos elétrons significa que praticamente toda a massa de um átomo se concentra em seu núcleo.

Para Memorizar:

Na eletrosfera, encontramos os:

- **Elétrons:**
  - Partículas com carga elétrica negativa (-1).
  - Possuem massa desprezível em comparação com prótons e nêutrons (aproximadamente 1/1836 da massa de um próton).

Em um átomo eletricamente neutro, o **número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons**, garantindo que as cargas positivas e negativas se equilibrem perfeitamente. Esta condição de neutralidade elétrica representa o estado fundamental da matéria, mas não é uma condição permanente.

Quando um átomo perde ou ganha elétrons, sua neutralidade elétrica é rompida, transformando-se em um **íon**. A **perda de um ou mais elétrons**, deixando um excesso de prótons, resulta em um **cátion**, um íon de carga positiva. Por exemplo, quando um átomo de sódio (11 prótons, 11 elétrons) perde um elétron, torna-se o cátion Na+, com 11 prótons e apenas 10 elétrons.

Conversamente, o **ganho de elétrons** produz um **ânion**, um íon de carga negativa. Um átomo de cloro (17 prótons, 17 elétrons) que ganha um elétron torna-se o ânion Cl-, com 17 prótons e 18 elétrons. Esta capacidade de formar íons é fundamental para compreender as ligações químicas e a formação de compostos.

Um conceito fascinante surge quando consideramos átomos de um mesmo elemento que possuem números diferentes de nêutrons. Estes átomos, chamados **isótopos**, mantêm as mesmas propriedades químicas (pois têm o mesmo número de prótons) mas diferem em massa e, às vezes, em estabilidade nuclear.

O carbono, por exemplo, possui dois isótopos estáveis principais: o carbono-12 (6 prótons, 6 nêutrons) e o carbono-13 (6 prótons, 7 nêutrons). Ambos são quimicamente idênticos, formando as mesmas ligações e participando das mesmas reações, mas o carbono-13 é ligeiramente mais pesado.

Além dos isótopos, a química reconhece outras relações interessantes entre átomos. **Isóbaros** são átomos de elementos diferentes que possuem o mesmo número de massa. Por exemplo, o argônio-40 (18 prótons, 22 nêutrons) e o cálcio-40 (20 prótons, 20 nêutrons) são isóbaros, pois ambos têm A = 40.

charlene.hair@gmail.com
00412071061

Já os **isótonos** são átomos de elementos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons. O carbono-14 (6 prótons, 8 nêutrons) e o nitrogênio-15 (7 prótons, 8 nêutrons) são isótonos, pois ambos contêm 8 nêutrons.
Esses conceitos fundamentais – prótons definindo a identidade dos elementos, elétrons determinando as cargas iônicas, nêutrons influenciando a massa e estabilidade, e as várias relações entre átomos com diferentes composições nucleares – formam o alicerce sobre o qual toda a química se constrói. A compreensão profunda desta estrutura atômica nos permite prever e explicar o comportamento da matéria em todas as suas manifestações químicas.

Como isso cai na prova?

Este é um dos tópicos mais recorrentes. As bancas adoram questões que exigem o cálculo do número de prótons, nêutrons e elétrons para átomos neutros e, especialmente, para íons. A diferenciação entre isótopos, isóbaros e isótonos é um clássico. Geralmente, a questão apresenta dois ou mais átomos (representados como X, Y, Z com seus números atômicos e de massa) e pede para o candidato identificar a relação entre eles.

1. (Questão Inédita - Corrigida) Considere os seguintes átomos: X (com 19 prótons e número de massa 39) e Y (com 20 prótons e número de massa 40). Um íon Z^{2-} é formado a partir de um átomo que possui 16 prótons e número de massa 32. Com base nessas informações, é correto afirmar que:

a) X e Y são isóbaros.
b) O número de nêutrons em X é 20.
c) O número de elétrons no íon Z^{2-} é 16.
d) Y e o átomo que origina o íon Z são isótopos.

Resposta: Letra B

Comentário:
a) Incorreto. Z de X é 19, Z de Y é 20. A de X é 39, A de Y é 40.
b) Correto. Nêutrons em X = A - Z = 39 - 19 = 20.
c) Incorreto. Elétrons em Z^{2-} = Z + carga = 16 + 2 = 18.
d) Incorreto. Têm número de prótons diferentes (20 e 16).

charlene.hair@gmail.com
00412071061

2. (Questão Inédita) Dois átomos, A e B, são isóbaros. O átomo A possui número atômico 26 e número de nêutrons 30. O átomo B possui 28 nêutrons. O número atômico do átomo B é:

a) 26
b) 28
c) 30
d) 56

Resposta: Letra B

Comentário:
Primeiro, achar o número de massa (A) de A: A = Z + n = 26 + 30 = 56.
Como A e B são isóbaros, ambos têm A = 56.
Para B, sabemos que A = 56 e n = 28.
Portanto, Z de B = A - n = 56 - 28 = 28.

A ELETROSFERA E A DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA

Compreendida a evolução dos modelos atômicos e a natureza das partículas fundamentais, chegamos agora a um dos aspectos mais fascinantes e práticos da estrutura atômica: a organização dos elétrons na eletrosfera. Esta organização não é aleatória, mas segue princípios rigorosos que determinam não apenas a estabilidade dos átomos, mas também suas propriedades químicas e sua capacidade de formar ligações.

A distribuição eletrônica representa o verdadeiro mapa que nos permite compreender o comportamento químico dos elementos. É através desta organização que podemos prever como os átomos interagirão entre si, que tipos de ligações formarão e que propriedades apresentarão. Vamos mergulhar neste universo organizado da eletrosfera, explorando seus níveis e subníveis de energia, e descobrindo como os números quânticos funcionam como coordenadas precisas para localizar cada elétron.

Níveis, Subníveis e o Diagrama de Linus Pauling

A eletrosfera, longe de ser uma região caótica onde os elétrons se movem aleatoriamente, apresenta uma organização sofisticada baseada em **níveis e subníveis de energia**. Esta organização, fundamentada nos princípios da mecânica quântica, determina completamente o comportamento químico dos átomos e constitui a chave para compreender a periodicidade das propriedades dos elementos.



Segundo o modelo desenvolvido a partir das contribuições de Bohr e refinado pela mecânica quântica, a eletrosfera está **dividida em até 7 camadas ou níveis de energia**, tradicionalmente designados pelas letras **K, L, M, N, O, P e Q**, correspondendo respectivamente aos números **1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**. Esta nomenclatura, embora possa parecer arbitrária, reflete a ordem histórica de descoberta dos raios X característicos dos elementos.

A camada K, mais próxima do núcleo, representa o nível de menor energia e maior estabilidade. À medida que nos afastamos do núcleo, os níveis energéticos aumentam progressivamente: L possui energia maior que K, M maior que L, e assim sucessivamente. Esta hierarquia energética é fundamental, pois os elétrons tendem naturalmente a ocupar os níveis de menor energia disponível, buscando a configuração mais estável possível.

Cada nível de energia comporta um **número máximo específico de elétrons**, determinado pela relação matemática $\mathbf{2n^2}$, onde n é o número do nível. Assim, o nível K (n=1) pode conter no máximo 2 elétrons, o nível L (n=2) até 8 elétrons, o nível M (n=3) até 18 elétrons, e assim por diante. Esta limitação não é arbitrária, mas resulta diretamente dos princípios quânticos que governam o comportamento dos elétrons.

Contudo, a organização da eletrosfera revela-se ainda mais sofisticada quando descobrimos que cada nível de energia, por sua vez, está **subdividido em subníveis de energia**, representados pelas letras **s, p, d, f**. Estes subníveis correspondem a diferentes formas de orbitais, ou seja, diferentes geometrias das regiões onde os elétrons podem ser encontrados.

O subnível **s** (do inglês "sharp") apresenta forma esférica e pode conter no máximo **2 elétrons**. Todo nível de energia, do primeiro ao sétimo, contém pelo menos um subnível s. Imagine uma esfera centrada no núcleo: esta é a forma característica do orbital s.

O subnível **p** (do inglês "principal") aparece a partir do segundo nível de energia e possui forma que lembra halteres ou "8" tridimensional, podendo conter no

máximo **6 elétrons** distribuídos em três orbitais distintos orientados perpendicularmente entre si no espaço.

Os subníveis **d** (do inglês "diffuse") surgem a partir do terceiro nível de energia, apresentam geometrias mais complexas e podem acomodar até **10 elétrons** em cinco orbitais diferentes. Finalmente, os subníveis **f** (do inglês "fundamental") aparecem a partir do quarto nível, possuem formas extremamente complexas e comportam até **14 elétrons** em seven orbitais distintos.

A distribuição dos elétrons nestes subníveis segue o **Princípio de Aufbau** (do alemão "construção"), que estabelece uma regra fundamental: **os elétrons preenchem primeiro os orbitais de menor energia**.

Esta regra, aparentemente simples, governa toda a organização eletrônica e explica as propriedades periódicas dos elementos.

Para determinar a ordem crescente de energia dos subníveis, os químicos utilizam uma ferramenta extraordinariamente útil: o **Diagrama de Linus Pauling**. Este diagrama, desenvolvido pelo químico americano Linus Pauling, organiza todos os subníveis em uma sequência diagonal que revela, de forma visual e prática, a ordem correta de preenchimento eletrônico.

O diagrama consiste em uma série de **diagonais descendentes** que conectam subníveis de energia semelhante. Seguindo estas diagonais da esquerda para a direita e de cima para baixo, obtemos a sequência de preenchimento:

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p.

charlene.hair@gmail.com
00412071061



Note como esta sequência revela uma característica surpreendente: o subnível 4s possui energia menor que o 3d, sendo preenchido antes deste. Esta inversão, que pode parecer contraditiva à primeira vista, resulta dos efeitos combinados da atração nuclear e da repulsão intereletrônica, demonstrando a sofisticação da organização atômica.

A aplicação prática do Diagrama de Pauling permite-nos determinar a **distribuição eletrônica** de qualquer elemento. Consideremos, por exemplo, o elemento sódio (Z=11). Seguindo a ordem diagonal, distribuímos seus 11 elétrons: $1s^2$, $2s^2$, $2p^6$, $3s^1$. Esta notação indica que o subnível 1s contém 2 elétrons, o 2s contém 2, o 2p contém 6, e o 3s contém 1 elétron.

A **camada de valência**, conceito de importância fundamental, é a camada mais externa que contém elétrons. Para o sódio, a camada de valência é a terceira (M), contendo apenas 1 elétron. Os elétrons de valência são os protagonistas das ligações químicas, pois são os mais fracamente ligados ao núcleo e, portanto, os mais disponíveis para participar de interações com outros átomos.

Esta organização elegante da eletrosfera não é meramente uma curiosidade teórica, mas a base fundamental para compreender toda a química. A configuração eletrônica determina se um elemento será metal ou ametal, se formará ligações iônicas ou covalentes, quantas ligações pode estabelecer, e uma infinidade de outras propriedades que governam o comportamento da matéria.

charlene.hair@gmail.com
00412071061

Números Quânticos

Para caracterizar completamente um elétron em um átomo e descrever seu estado energético com precisão absoluta, a mecânica quântica desenvolveu um sistema sofisticado de **quatro números quânticos**. Estes números funcionam como verdadeiras "**coordenadas quânticas**", fornecendo informações completas sobre a localização energética, espacial e o estado de movimento de cada elétron individual.

Esta abordagem matemática pode parecer abstrata inicialmente, mas representa uma das conquistas mais elegantes da física moderna, permitindo-nos descrever com precisão o comportamento dos elétrons em qualquer átomo, por mais complexo que seja. Cada um dos quatro números quânticos revela um aspecto específico do estado eletrônico, e sua combinação oferece um retrato completo e único de cada elétron.

- O **Número Quântico Principal**, simbolizado pela letra **n**, indica o **nível de energia** do elétron, correspondendo à camada eletrônica em que ele se encontra. Seus valores são **números inteiros positivos de 1 a 7**, correspondendo às **camadas K, L, M, N, O, P e Q**, respectivamente. Quanto maior o valor de n, maior a energia do elétron e mais distante ele se encontra, em média, do núcleo atômico.

  Este número quântico principal determina o tamanho aproximado do orbital e a energia principal do elétron. Um elétron com n=1 encontra-se na camada mais próxima do núcleo, fortemente atraído pela carga nuclear positiva, enquanto um elétron com n=7 ocupa uma região muito mais afastada e possui energia consideravelmente maior.

- O **Número Quântico Secundário ou Azimutal**, representado pela letra **l**, define o **subnível de energia** e, fundamentalmente, **a forma geométrica do orbital**. Seus valores variam de **0 a (n-1)**, onde cada valor numérico corresponde a uma letra específica: l=0 corresponde ao subnível s, l=1 ao subnível p, l=2 ao subnível d, e l=3 ao subnível f.

A relação entre o número quântico principal e o secundário é restritiva e precisa. Para n=1, apenas l=0 é possível (apenas subnível s). Para n=2, l pode ser 0 ou 1 (subníveis s e p). Para n=3, l pode ser 0, 1 ou 2 (subníveis s, p e d). Esta progressão explica por que os subníveis d aparecem apenas a partir do terceiro nível de energia, e os subníveis f somente a partir do quarto.

O número quântico azimutal não apenas determina a forma do orbital, mas também influencia sutilmente a energia do elétron. Dentro de um mesmo nível principal, os subníveis apresentam energias ligeiramente diferentes: **s < p < d < f,** uma diferença que se torna mais pronunciada nos níveis de energia mais elevados.

- O **Número Quântico Magnético**, simbolizado por **ml**, descreve a **orientação espacial do orbital** dentro do subnível. Seus valores variam de **-l a +l, incluindo o zero**, determinando quantos orbitais existem em cada subnível e como eles se orientam no espaço tridimensional.

  Para o subnível s (l=0), ml pode ser apenas 0, indicando um único orbital com simetria esférica. Para o subnível p (l=1), ml pode ser -1, 0 ou +1, correspondendo a três orbitais p orientados perpendicularmente entre si ao longo dos eixos x, y e z. Para o subnível d (l=2), ml varia de -2 a +2, resultando em cinco orbitais d com orientações espaciais distintas e complexas.

  Esta orientação espacial dos orbitais não é meramente uma abstração matemática, mas possui consequências químicas profundas, determinando as direções preferenciais das ligações químicas e, consequentemente, a geometria molecular dos compostos.

- O **Número Quântico de Spin**, representado por **ms**, refere-se ao **momento angular intrínseco do elétron**, uma propriedade fundamental que pode ser visualizada, embora imperfeitamente, como o sentido de rotação da partícula em torno de seu próprio eixo. Este número quântico pode assumir apenas dois valores: **+1/2 e -1/2**, convencionalmente representados por setas apontando para cima (↑) e para baixo (↓).

> O conceito de spin é puramente quântico e não possui análogo clássico perfeito. Contudo, para fins didáticos, podemos imaginar o elétron como uma pequena esfera que gira em um de dois sentidos possíveis. Esta propriedade é fundamental para compreender como os elétrons se organizam nos orbitais e como formam pares.

A importância dos números quânticos torna-se evidente quando consideramos o **Princípio da Exclusão de Pauli**, uma das leis mais fundamentais da mecânica quântica. Este princípio estabelece que **em um mesmo átomo, não podem existir dois elétrons com os quatro números quânticos idênticos**. Em outras palavras, cada elétron em um átomo possui uma "impressão digital" quântica única.

Esta restrição fundamental explica por que um orbital pode conter no máximo dois elétrons: eles devem necessariamente diferir pelo menos no número quântico de spin. Dois elétrons no mesmo orbital (mesmos n, l e ml) devem ter spins opostos (ms = +1/2 e ms = -1/2), formando o que chamamos de par eletrônico.

Complementando o Princípio de Pauli, a **Regra de Hund** determina como os elétrons preenchem orbitais de mesma energia. Segundo esta regra, **ao preencher orbitais degenerados** (de mesma energia), **os elétrons se distribuem inicialmente de forma individual**, com spins paralelos, antes de começarem a formar pares. Este comportamento minimiza a repulsão intereletrônica e resulta na configuração mais estável.

Por exemplo, ao distribuir três elétrons nos três orbitais p, eles ocuparão inicialmente um orbital cada, todos com o mesmo spin: ↑ ↑ ↑. Somente quando um quarto elétron for adicionado, ele formará par com um dos elétrons já presentes: ↑↓ ↑ ↑.

A aplicação conjunta destes princípios – Aufbau, Pauli e Hund – permite-nos determinar com precisão a configuração eletrônica de qualquer elemento em seu estado fundamental. Esta configuração, por sua vez, determina completamente as propriedades químicas do elemento, desde sua capacidade de formar ligações até sua posição na Tabela Periódica.

Os números quânticos, portanto, não são meros construtos matemáticos abstratos, mas ferramentas poderosas que nos permitem compreender e prever o comportamento da matéria em seu nível mais fundamental. Eles representam a linguagem precisa através da qual podemos descrever a organização eletrônica e, consequentemente, toda a riqueza da química molecular.

Como isso cai na prova?

Questões sobre distribuição eletrônica são garantidas. O candidato precisa dominar o Diagrama de Linus Pauling para escrever a configuração de qualquer elemento. As bancas pedem para identificar a camada de valência, o número de elétrons na camada de valência e o subnível mais energético. Outro tipo de questão muito comum é fornecer um elemento e pedir o conjunto dos quatro números quânticos do seu elétron mais energético ou de valência.

Questões

1. (Questão Inédita) O elemento químico Ferro (Fe) possui número atômico Z=26. A sua distribuição eletrônica em ordem energética é:

a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^8$
b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$
c) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^7$
d) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^6\ 4s^2$

Resposta: Letra B

Comentário:
(Seguindo o Diagrama de Pauling: $1s^2$, $2s^2$, $2p^6$, $3s^2$, $3p^6$, $4s^2$, $3d^6$)

2. (Questão Inédita) O elétron de diferenciação (o último a ser distribuído na ordem energética) de um átomo de Enxofre (S, Z=16) está localizado no subnível 3p. Considerando a distribuição dos elétrons nos orbitais deste subnível (-1, 0, +1), qual o conjunto de números quânticos (n, ℓ, mℓ, ms) que descreve

corretamente este último elétron? (Considere que o preenchimento começa com spin +1/2).

a) n=3, ℓ=1, mℓ=-1, ms=-1/2
b) n=3, ℓ=1, mℓ=0, ms=+1/2
c) n=3, ℓ=2, mℓ=-1, ms=-1/2
d) n=3, ℓ=0, mℓ=0, ms=+½

Resposta: Letra A

Comentário:
Distribuição do S (Z=16): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$.
O elétron de diferenciação está no $3p^4$.
Regra de Hund para $3p^4$: Os orbitais p são (-1, 0, +1).

1º elétron: $3p^1$, orbital -1, spin +1/2
2º elétron: $3p^2$, orbital 0, spin +1/2
3º elétron: $3p^3$, orbital +1, spin +1/2
4º elétron: $3p^4$, orbital -1, spin -½

Portanto, os números quânticos são: n=3, ℓ=1, mℓ=-1, ms=-1/2.

TABELA PERIÓDICA: ORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Armados com o conhecimento da estrutura atômica e da distribuição eletrônica, chegamos agora a uma das maiores conquistas da ciência: a Tabela Periódica dos Elementos. Esta ferramenta extraordinária representa muito mais que uma simples lista de elementos químicos; ela é um mapa detalhado que revela as relações íntimas entre a estrutura atômica e as propriedades da matéria.

A genialidade da Tabela Periódica reside em sua capacidade de organizar todos os elementos conhecidos de tal forma que suas propriedades químicas e físicas seguem padrões previsíveis e repetitivos. É como se a natureza seguisse uma partitura musical, onde cada elemento ocupa sua posição específica numa sinfonia harmoniosa de propriedades periódicas.

Esta organização sistemática não apenas nos permite compreender os elementos já conhecidos, mas também prever as propriedades de elementos ainda não descobertos, demonstrando o poder preditivo extraordinário da ciência quando ela consegue capturar os padrões fundamentais da natureza.

Estrutura e Organização

A Tabela Periódica moderna é o resultado de uma evolução histórica fascinante que ilustra perfeitamente como o conhecimento científico se constrói através de contribuições sucessivas, cada uma refinando e aperfeiçoando o trabalho anterior. Esta jornada intelectual culminou na ferramenta de organização mais poderosa da química.

O marco inicial desta história remonta a **1869**, quando **Dmitri Mendeleev**, químico russo de visão extraordinária, propôs uma organização revolucionária dos elementos conhecidos em sua época. Mendeleev organizou os elementos em **ordem crescente de massa atômica**, mas sua verdadeira genialidade foi perceber que, quando organizados desta forma, elementos com propriedades químicas semelhantes apareciam em intervalos regulares, sugerindo uma periodicidade natural.

A audácia de Mendeleev foi ainda maior quando ele decidiu deixar **espaços vazios** em sua tabela para elementos que, segundo sua lógica, deveriam existir mas ainda não haviam sido descobertos. Mais impressionante ainda, ele foi capaz de **prever com precisão notável as propriedades** destes elementos desconhecidos, baseando-se nos padrões que identificam. Quando elementos como o gálio, o escândio e o germânio foram posteriormente descobertos, suas propriedades correspondiam quase exatamente às previsões de Mendeleev, validando de forma espetacular sua abordagem.

Contudo, a tabela de Mendeleev apresentou algumas inconsistências. Em certos casos, para manter elementos com propriedades semelhantes na mesma coluna, ele precisou inverter a ordem crescente de massa atômica. Estes "problemas" foram resolvidos apenas em **1913**, quando **Henry Moseley** descobriu o verdadeiro princípio organizador da tabela.

Moseley, através de seus estudos com raios X, estabeleceu que o critério correto de organização não é a massa atômica, mas sim o **número atômico (Z)** – o número de prótons no núcleo. Esta descoberta não apenas eliminou as inconsistências da tabela de Mendeleev, mas também forneceu a base teórica sólida que explica por que a periodicidade existe: elementos com o mesmo número de elétrons na camada de valência apresentam propriedades químicas semelhantes.

A **Tabela Periódica moderna** está estruturada como uma grade retangular organizada em **linhas horizontais chamadas períodos** e **colunas verticais chamadas grupos ou famílias**. Esta aparente simplicidade geométrica esconde uma organização extraordinariamente sofisticada baseada na distribuição eletrônica dos elementos.



Existem **7 períodos** na tabela, numerados de 1 a 7 de cima para baixo. O fascinante sobre os períodos é que o **número do período corresponde exatamente ao número de camadas eletrônicas** (níveis de energia) que os átomos dos elementos daquela linha possuem. Todos os elementos do primeiro período (hidrogênio e hélio) possuem apenas uma camada eletrônica. Os elementos do segundo período (do lítio ao neônio) possuem duas camadas, e assim sucessivamente.

Esta correlação direta entre posição na tabela e estrutura eletrônica revela a beleza intrínseca da organização periódica. Um simples olhar para a posição de um elemento na tabela nos informa imediatamente quantas camadas eletrônicas seus átomos possuem, conectando instantaneamente a posição macroscópica com a estrutura microscópica.

Às 18 **colunas verticais**, denominadas **grupos ou famílias**, representam o aspecto mais quimicamente relevante da organização periódica. Os elementos em um mesmo grupo possuem **propriedades químicas semelhantes** porque apresentam o **mesmo número de elétrons na camada de valência**. Esta é a chave mestra que explica a periodicidade: elementos com configurações eletrônicas de valência idênticas tendem a formar os mesmos tipos de ligações químicas e exibir reatividades similares.

Esta organização em grupos é tão significativa que alguns deles receberam **nomes especiais** que refletem características marcantes de seus elementos. O **Grupo 1** é conhecido como **Metais Alcalinos** (excluindo o hidrogênio), elementos altamente reativos que formam bases (álcalis) quando combinados com água. O **Grupo 2** compreende os **Metais Alcalinos Terrosos**, assim denominados porque seus óxidos eram historicamente chamados de "terras" e produzem soluções alcalinas.

No extremo direito da tabela, o **Grupo 17** abriga os **Halogênios** (do grego "formadores de sal"), elementos altamente eletronegativos que facilmente formam sais iônicos com metais. O **Grupo 18** contém os **Gases Nobres**, elementos de reatividade extraordinariamente baixa devido à sua configuração eletrônica estável e completa.

A numeração dos grupos evoluiu historicamente, mas a convenção moderna utiliza os números de 1 a 18 da esquerda para a direita. Esta numeração não é arbitrária: ela reflete, com algumas exceções nos elementos de transição, o número máximo de elétrons de valência que os elementos do grupo podem apresentar.

A relação entre a posição de um elemento na tabela e sua **configuração eletrônica** é direta e previsível. Conhecendo apenas o número atômico de um elemento e sua posição na tabela, podemos imediatamente determinar sua distribuição eletrônica completa. Esta conexão íntima entre posição e estrutura eletrônica faz da Tabela Periódica uma ferramenta de poder preditivo incomparável.

Por exemplo, todos os elementos do Grupo 1 (exceto o hidrogênio) terminam sua configuração eletrônica com ns^1, onde n é o número do período. O sódio (período 3) termina em $3s^1$, o potássio (período 4) em $4s^1$, e assim por diante. Esta regularidade permite-nos prever não apenas a configuração eletrônica, mas também o comportamento químico de qualquer elemento baseado em sua posição na tabela.

charlene.hair@gmail.com
00412071061

Para Memorizar:

A Tabela Periódica é uma ferramenta extraordinária que organiza os elementos de forma a revelar padrões previsíveis em suas propriedades.

Estrutura e Organização

- **Marco Histórico:**
  - Dmitri Mendeleev (1869): Organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica e previu a existência de elementos ainda não descobertos.
  - Henry Moseley (1913): Estabeleceu que o critério correto de organização é o número atômico (Z).

- **Estrutura Moderna:**
  - Períodos:
    - São as 7 linhas horizontais.
    - O número do período corresponde ao número de camadas eletrônicas do átomo.

  - **Grupos ou Famílias:**
    - São as 18 colunas verticais.
    - Elementos de um mesmo grupo possuem propriedades químicas semelhantes porque têm o mesmo número de elétrons na camada de valência.

charlene.hair@gmail.com
00412071061

Classificação dos Elementos

A diversidade de elementos químicos presentes na Tabela Periódica pode parecer avassaladora à primeira vista, mas uma análise mais cuidadosa revela padrões claros que permitem classificá-los em **grandes categorias baseadas em suas propriedades fundamentais**. Esta classificação não é meramente acadêmica; ela reflete diferenças profundas na estrutura eletrônica que se manifestam em comportamentos químicos e físicos distintos.



A **maioria esmagadora dos elementos são metais**, ocupando aproximadamente três quartos da tabela periódica e localizados predominantemente **à esquerda e no centro** da tabela. Esta preponderância dos metais não é coincidência, mas reflete uma tendência fundamental da estrutura eletrônica: elementos com poucos elétrons na camada de valência tendem a perdê-los facilmente, característica definitiva do comportamento metálico.

Os **metais** apresentam um conjunto característico de propriedades que os torna únicos entre os materiais. São geralmente **bons condutores de calor e eletricidade**, uma propriedade que resulta da mobilidade dos elétrons de valência, que formam um "mar eletrônico" ao redor dos núcleos atômicos. Possuem **brilho característico** quando polidos, reflexo da capacidade de seus elétrons móveis interagirem com a radiação eletromagnética.

A **maleabilidade** (capacidade de ser moldado em lâminas) e a **ductilidade** (capacidade de ser estirado em fios) dos metais resultam da natureza

não-direcional de suas ligações metálicas. Ao contrário das ligações covalentes rígidas, as ligações metálicas permitem que os átomos deslizem uns sobre os outros sem quebrar a estrutura fundamental, explicando por que podemos forjar ferro ou estirar cobre em fios.

Quimicamente, os metais apresentam uma tendência fundamental de **perder elétrons para formar cátions** (íons positivos). Esta tendência, denominada caráter eletropositivo, resulta da atração relativamente fraca que o núcleo exerce sobre os elétrons de valência quando estes são poucos em número.

Dentro da grande família dos metais, encontramos subdivisões importantes que refletem variações na estrutura eletrônica e, consequentemente, no comportamento químico.

- Os **Metais Alcalinos (Grupo 1)** são os mais reativos de todos os metais, possuindo apenas um elétron na camada de valência que é facilmente removido. Sua reatividade é tão intensa que reagem violentamente com a água, produzindo hidrogênio gasoso e bases fortes.

- Os **Metais Alcalino Terrosos (Grupo 2)** possuem dois elétrons de valência e, embora menos reativos que os alcalinos, ainda apresentam alta reatividade, especialmente com água e oxigênio. Seus óxidos e hidróxidos são básicos, justificando o termo "alcalino terroso".

Uma categoria especialmente importante são os **Metais de Transição (Grupos 3 a 12)**, que ocupam a região central da tabela. Estes elementos apresentam características únicas resultantes do preenchimento progressivo dos orbitais d. São geralmente mais duros e possuem pontos de fusão mais elevados que outros metais, além de frequentemente formar compostos coloridos e apresentarem múltiplos estados de oxidação.

Contrastando com os metais, os **ametais** (ou não-metais) ocupam **o canto superior direito** da tabela e apresentam propriedades essencialmente opostas. São geralmente **maus condutores** de calor e eletricidade, **não possuem brilho metálico** (com raras exceções como o iodo), e são **quebradiços** no estado sólido, não podendo ser moldados ou estirados.

A característica química mais marcante dos ametais é sua tendência de **ganhar elétrons para formar ânions** (íons negativos), comportamento oposto ao dos metais. Esta tendência resulta da forte atração que núcleos com muitos prótons exercem sobre elétrons adicionais, especialmente quando a camada de valência está próxima de ser completada.

- Os **Halogênios (Grupo 17)** representam os ametais mais reativos, possuindo sete elétrons na camada de valência e necessitando apenas de mais um elétron para atingir a configuração estável de gás nobre. Esta proximidade da estabilidade os torna extremamente eletronegativos e reativos, formando facilmente compostos iônicos com metais e covalentes entre si.

- Uma categoria única e fascinante são os **Gases Nobres (Grupo 18)**, ametais caracterizados por sua **baixíssima reatividade química**. Esta inércia química resulta de sua **camada de valência completa**: todos possuem 8 elétrons na camada externa (exceto o hélio, que possui 2), uma configuração de máxima estabilidade conhecida como "regra do octeto".

A estabilidade dos gases nobres é tão pronunciada que, durante décadas, acreditou-se que eram completamente inertes. Somente na década de 1960 foram sintetizados os primeiros compostos de gases nobres, e mesmo assim apenas dos elementos mais pesados (xenônio e criptônio) em condições muito específicas.

O **Hidrogênio (H)** representa um caso absolutamente único na classificação periódica. Embora frequentemente posicionado no **Grupo 1** da tabela, suas propriedades são **distintas** de todos os outros elementos, não se encaixando perfeitamente em nenhuma categoria tradicional. É um ametal gasoso nas condições normais, pode formar tanto cátions (H^+) quanto ânions (H^-), e participa de ligações covalentes com ametais.

A fronteira entre metais e ametais não é uma linha rígida, mas uma região de **transição ocupada pelos semimetais ou metaloides**. Estes elementos, que incluem o boro, silício, germânio, arsênio, antimônio e telúrio, apresentam

propriedades intermediárias entre metais e ametais. São semicondutores, tendo condutividade elétrica maior que os ametais típicos, mas menor que os metais verdadeiros, uma propriedade que os torna fundamentais na tecnologia eletrônica moderna.

Esta classificação dos elementos não é meramente descritiva, mas reflete diferenças fundamentais na estrutura eletrônica que determinam todas as propriedades químicas e físicas. A posição de um elemento na tabela periódica nos informa imediatamente sobre sua classificação e, consequentemente, sobre seu comportamento químico esperado, demonstrando mais uma vez o poder organizacional e preditivo da Tabela Periódica.

Como isso cai na prova?

As bancas esperam que o candidato saiba localizar um elemento na tabela a partir de seu número atômico ou distribuição eletrônica. Questões clássicas pedem para determinar o período e o grupo de um elemento. Além disso, a classificação é fundamental: dado um elemento, o candidato deve ser capaz de classificá-lo como metal, ametal, halogênio, gás nobre, etc., e justificar essa classificação com base em suas propriedades ou configuração eletrônica.

Questões

1. (Questão Inédita) Um elemento químico apresenta a seguinte distribuição eletrônica em sua camada de valência: $4s^2\ 4p^5$. Com base nesta informação, é correto afirmar que o elemento está localizado no:

a) Período 4, Grupo 2.
b) Período 5, Grupo 4.
c) Período 4, Grupo 17.
d) Período 5, Grupo 15.

Resposta: Letra C

Comentário:
Período: O maior nível (n) é 4, então está no 4º período.

charlene.hair@gmail.com
00412071061

Grupo: Elementos do bloco "p" (terminados em s^2p^x) têm seu grupo determinado por 10 + (elétrons em s + elétrons em p). Grupo = 10 + (2 + 5) = 17. É um halogênio.

2. (Questão Inédita) O elemento Sódio (Na, Z=11) e o elemento Cloro (Cl, Z=17) são, respectivamente, classificados como:

a) Metal Alcalino e Halogênio.
b) Gás Nobre e Metal de Transição.
c) Metal Alcalino Terroso e Ametal.
d) Halogênio e Metal Alcalino.

Resposta: Letra A

Comentário:
Distribuição do Na (Z=11): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$. Termina em s^1, logo, é do Grupo 1 (Metal Alcalino).
Distribuição do Cl (Z=17): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$. Termina com 7 elétrons na camada de valência, logo, é do Grupo 17 (Halogênio).

PROPRIEDADES PERIÓDICAS DOS ELEMENTOS

A verdadeira magnitude da Tabela Periódica como ferramenta científica não reside apenas em sua capacidade de organizar os elementos, mas em seu poder extraordinário de revelar padrões previsíveis no comportamento da matéria. As propriedades dos elementos não variam aleatoriamente; elas seguem tendências sistemáticas e repetitivas que refletem a organização fundamental da estrutura eletrônica.

Estas **propriedades periódicas** constituem um dos aspectos mais elegantes e úteis da química, permitindo-nos não apenas compreender por que os elementos se comportam de determinada maneira, mas também prever as propriedades de elementos com base simplesmente em sua posição na tabela. É como se a natureza tivesse escrito suas leis em uma linguagem geométrica, onde a posição espacial revela verdades fundamentais sobre a estrutura da matéria.

O estudo dessas variações periódicas nos conduz ao coração da química moderna, onde a estrutura atômica, a organização eletrônica e as propriedades macroscópicas se conectam de forma harmoniosa e previsível. Cada propriedade periódica conta uma história sobre como os elétrons interagem com o núcleo atômico e como essas interações se manifestam no mundo tangível.

Variação das Propriedades

As **propriedades dos elementos químicos variam de forma previsível e periódica**, seguindo padrões que se repetem ao longo dos grupos e períodos da tabela. Esta periodicidade não é coincidência, mas consequência direta das mudanças sistemáticas na estrutura eletrônica dos átomos. Compreender essas variações equivale a possuir um mapa detalhado do comportamento da matéria.

O **Raio Atômico** representa uma das propriedades mais fundamentais e influentes de um átomo. Definido como **a metade da distância entre os núcleos de dois átomos idênticos** ligados covalentemente, o raio atômico

determina não apenas o tamanho físico dos átomos, mas também influencia profundamente todas as demais propriedades periódicas.

A variação do raio atômico ao longo da Tabela Periódica revela padrões claros e explicáveis. **Em um grupo**, o raio atômico **aumenta consistentemente de cima para baixo**. Esta tendência resulta da **adição progressiva de novas camadas eletrônicas** à medida que descemos no grupo. Cada nova camada situa-se mais distante do núcleo, aumentando naturalmente o tamanho atômico.

Consideremos, por exemplo, os elementos do Grupo 1: o lítio possui duas camadas eletrônicas, o sódio três, o potássio quatro, e assim sucessivamente. Embora a carga nuclear aumente progressivamente (3 prótons no lítio, 11 no sódio, 19 no potássio), este aumento é mais que compensado pelo efeito do acréscimo de camadas eletrônicas, resultando em átomos cada vez maiores.

Em um período, observamos o comportamento oposto: o raio atômico **diminui consistentemente da esquerda para a direita**. Este fenômeno, à primeira vista contraditório, explica-se pela **crescente carga nuclear** que atrai mais intensamente os elétrons da mesma camada principal. À medida que nos movemos da esquerda para a direita, o número de prótons aumenta enquanto o número de camadas permanece constante, resultando em uma atração nuclear mais forte que "contrai" a eletrosfera.

Este efeito é especialmente pronunciado nos períodos menores. No segundo período, por exemplo, o lítio (3 prótons) possui um raio atômico significativamente maior que o flúor (9 prótons), ambos com duas camadas eletrônicas. A carga nuclear mais intensa do flúor exerce uma atração muito maior sobre seus elétrons, comprimindo-os mais próximo ao núcleo.

A **Energia de Ionização** representa **a energia mínima necessária para remover completamente um elétron de um átomo isolado no estado gasoso**, transformando-o em um cátion. Esta propriedade revela diretamente a força com que os elétrons estão ligados ao núcleo atômico e **varia de forma inversa ao raio atômico**.

A lógica desta relação inversa é elegante: quanto menor o átomo, mais próximos os elétrons estão do núcleo positivo e, consequentemente, mais energia é necessária para removê-los. Por outro lado, em átomos maiores, os elétrons mais externos encontram-se mais distantes da atração nuclear e são mais facilmente removidos.

Assim, a energia de ionização **aumenta da esquerda para a direita** em um período, acompanhando a diminuição do raio atômico. Os metais alcalinos (extrema esquerda) possuem as menores energias de ionização, perdendo facilmente seus elétrons de valência, enquanto os gases nobres (extrema direita) apresentam as maiores energias de ionização, resistindo fortemente à remoção de elétrons.

Em um grupo, a energia de ionização **diminui de cima para baixo**, seguindo o aumento do raio atômico. Os elétrons de valência dos elementos mais pesados encontram-se em camadas mais distantes do núcleo, sendo mais facilmente removidos apesar da maior carga nuclear.

Esta tendência explica perfeitamente o comportamento químico observado. O césio, na base do Grupo 1, é extremamente reativo e perde seu elétron de valência com facilidade mínima, enquanto o lítio, no topo do mesmo grupo, embora ainda muito reativo, requer mais energia para formar cátions.

A **Afinidade Eletrônica** (ou **eletroafinidade**) mede **a energia liberada quando um átomo neutro, no estado gasoso, captura um elétron** para formar um ânion. Esta propriedade revela a tendência dos átomos de atrair elétrons adicionais e **segue essencialmente a mesma tendência da energia de ionização**.

Átomos pequenos com núcleos altamente carregados exercem forte atração sobre elétrons adicionais, liberando mais energia quando os capturam. Por isso, a afinidade eletrônica geralmente **aumenta da esquerda para a direita** ao longo de um período e **diminui de cima para baixo** em um grupo.

Os halogênios apresentam as maiores afinidades eletrônicas, particularmente o cloro, que libera energia significativa ao formar o ânion Cl^-. Esta alta afinidade

eletrônica explica a tendência natural destes elementos de formar ânions e sua alta reatividade com metais eletropositivos.

A **Eletronegatividade** representa **a tendência que um átomo tem de atrair para si os elétrons compartilhados em uma ligação química**. Esta propriedade, fundamental para compreender a natureza das ligações químicas, também **aumenta da esquerda para a direita** ao longo de um período e **de baixo para cima** em um grupo.

A escala de eletronegatividade mais utilizada foi desenvolvida por Linus Pauling, atribuindo valores numéricos que facilitam comparações quantitativas. O **flúor (F) é o elemento mais eletronegativo** de toda a tabela periódica, com valor 4,0 na escala de Pauling, refletindo sua capacidade extraordinária de atrair elétrons em ligações químicas.

Esta alta eletronegatividade do flúor resulta de sua pequena size atômica combinada com alta carga nuclear efetiva, criando um campo elétrico intenso que atrai poderosamente os elétrons. Os demais halogênios seguem em ordem decrescente de eletronegatividade: cloro, bromo, iodo, refletindo o aumento progressivo de seus raios atômicos.

No extremo oposto, os metais alcalinos, especialmente o césio e o frâncio, apresentam as menores eletronegatividades, indicando sua tendência de ceder elétrons em vez de atraí-los. Esta diferença fundamental explica por que metais alcalinos e halogênios formam ligações iônicas tão estáveis: a transferência completa de elétrons do metal eletropositivo para o halogênio eletronegativo.

A **Eletropositividade** (ou **caráter metálico**) representa o oposto conceitual da eletronegatividade, medindo **a tendência de um átomo perder elétrons**. Como propriedade inversa à eletronegatividade, ela **cresce de cima para baixo** em um grupo e **da direita para a esquerda** em um período.

Os elementos com maior eletropositividade são os metais alcalinos pesados, que perdem seus elétrons de valência com facilidade extrema, comportando-se como doadores de elétrons em praticamente todas as ligações que estabelecem.

Esta propriedade explica por que elementos como césio e rubídio são tão reativos e por que formam compostos predominantemente iônicos.

A **Densidade** dos elementos mostra um padrão mais complexo, mas ainda previsível. De modo geral, ela **tende a aumentar das extremidades para o centro** da tabela periódica. Esta tendência reflete o balanço entre massa atômica crescente e variações no volume atômico.

Os elementos de transição, localizados no centro da tabela, frequentemente apresentam as maiores densidades. Eles combinam massas atômicas consideráveis com estruturas compactas resultantes do preenchimento dos orbitais d. O ósmio, por exemplo, é um dos elementos mais densos conhecidos, com densidade próxima a 22,6 g/cm^3.

Os **pontos de fusão e ebulição** também exibem **tendências periódicas**, com **valores geralmente mais altos no centro da tabela**. Esta tendência relaciona-se com a força das ligações entre átomos no estado sólido ou líquido. Os metais de transição, com seus orbitais d parcialmente preenchidos que permitem ligações metálicas fortes e multidirecionais, frequentemente apresentam pontos de fusão elevados.

O tungstênio, com ponto de fusão de 3.695 K, exemplifica esta tendência. Sua estrutura eletrônica permite ligações metálicas excepcionalmente fortes, resultando em um dos maiores pontos de fusão conhecidos. Em contraste, os gases nobres, com ligações intermoleculares fracas, apresentam pontos de fusão e ebulição muito baixos.

Estas propriedades periódicas não existem isoladamente; elas estão intimamente interconectadas através dos princípios fundamentais da estrutura eletrônica. O raio atômico influencia todas as demais propriedades: energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e mesmo propriedades físicas como densidade e pontos de fusão.

A beleza das propriedades periódicas reside em sua previsibilidade. Conhecendo a posição de um elemento na Tabela Periódica, podemos imediatamente prever suas características relativas, comparando-o com elementos vizinhos e

estabelecendo expectativas sobre seu comportamento químico. Esta capacidade preditiva fez da Tabela Periódica não apenas um sistema de organização, mas uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento de novos materiais, a síntese de compostos e a compreensão fundamental da matéria.

O estudo das propriedades periódicas revela que a diversidade aparentemente infinita dos materiais ao nosso redor resulta de variações sistemáticas em algumas propriedades fundamentais dos átomos. Esta regularidade subjacente é um testemunho da ordem matemática que governa o universo em seu nível mais elementar, onde a posição de um elemento em uma grade bidimensional simples revela verdades profundas sobre a natureza da matéria.

Para Memorizar:

As propriedades dos elementos químicos variam de forma previsível e periódica ao longo da tabela.

Variação das Propriedades

Propriedade	Definição	Variação no Período (→)	Variação no Grupo (↓)
Raio Atômico	Metade da distância entre os núcleos de dois átomos idênticos ligados.	**Diminui** (↑ carga nuclear atrai mais os elétrons)	**Aumenta** (↑ número de camadas)
Energia de Ionização	Energia mínima para remover 1 elétron de um átomo no estado gasoso.	**Aumenta** (mais difícil remover elétron)	**Diminui** (mais fácil remover elétron)
Afinidade Eletrônica	Energia liberada quando um átomo no estado gasoso captura 1 elétron.	**Aumenta** (maior tendência a receber elétron)	**Diminui** (menor tendência a receber elétron)

Eletronegatividade	Tendência de um átomo de atrair para si elétrons em uma ligação química.	**Aumenta**	**Diminui**
Eletropositividade	Tendência de um átomo de perder elétrons (caráter metálico).	**Diminui**	**Aumenta**
Densidade	Relação massa/volume.	Aumenta das extremidades para o **centro**.	**Aumenta**
Ponto de Fusão/Ebulição	Temperatura de mudança de fase.	Aumenta das extremidades para o **centro**.	Variação complexa, mas geralmente diminui nos grupos 1 e 2 e aumenta nos demais.

Resumo da Tendência Principal (excluindo gases nobres):

- **Crescem para a direita e para cima:** Energia de Ionização, Afinidade Eletrônica, Eletronegatividade.
- **Cresce para a esquerda e para baixo:** Raio Atômico, Eletropositividade (Caráter Metálico).

Como isso cai na prova?

Este é um tópico de altíssima incidência. As bancas exigem que o candidato compare elementos e os ordene de acordo com uma propriedade periódica. Por exemplo: "Dados os elementos F, Cl e Br, ordene-os em ordem crescente de eletronegatividade". O segredo é primeiro localizar os elementos na tabela (mesmo que mentalmente) e depois aplicar a regra de variação da propriedade.

Questões

1. (Questão Inédita) Considere os elementos Sódio (Na, Z=11), Magnésio (Mg, Z=12) e Potássio (K, Z=19). A ordem crescente correta para a primeira energia de ionização é:

a) Na < Mg < K
b) K < Mg < Na
c) Mg < Na < K
d) K < Na < Mg

Resposta: Letra D

Comentário:
Localização: Na e Mg estão no período 3. K está no período 4, abaixo do Na.
Análise no Grupo: A energia de ionização diminui de cima para baixo. Logo, K < Na.
Análise no Período: A energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Logo, Na < Mg.
Juntando tudo: K tem a menor energia (maior raio), seguido pelo Na e depois pelo Mg. A ordem crescente é K < Na < Mg.

2. (Questão Inédita) O Flúor (F) é o elemento mais eletronegativo da Tabela Periódica. Qual das alternativas abaixo justifica corretamente essa propriedade?

a) Possuir um grande raio atômico e poucas camadas eletrônicas.
b) Ser um gás nobre com a camada de valência completa.
c) Possuir um pequeno raio atômico combinado com uma alta carga nuclear efetiva, exercendo forte atração sobre os elétrons.
d) Ser um metal alcalino com grande tendência a perder seu único elétron de valência.

Resposta: Letra C

Comentário:

(A combinação de pequeno raio e alta atração nuclear maximiza a eletronegatividade.)

charlene.hair@gmail.com
00412071061

QUESTÕES DESAFIO

1 (L.P_CZ1) Considere as seguintes afirmações sobre a evolução dos modelos atômicos:

I. O modelo de Thomson representou o primeiro a reconhecer a divisibilidade do átomo, propondo uma distribuição homogênea de cargas positivas e negativas.
II. Rutherford introduziu a noção de um núcleo denso e positivo, porém seu modelo contrariava as leis do eletromagnetismo ao prever elétrons em órbita estável.
III. Bohr solucionou a instabilidade do modelo de Rutherford introduzindo níveis de energia quantizados e órbitas estacionárias.
IV. O modelo quântico moderno substituiu as órbitas definidas por orbitais probabilísticos, mas manteve o conceito de trajetórias fixas no espaço.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas II e IV estão corretas.
d) Apenas III e IV estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

2 (L.P_CZ1) O elemento químico cromo (Cr, Z = 24) apresenta uma configuração eletrônica peculiar:

[Ar] $4s^1$ $3d^5$.

Considerando as regras de Aufbau, Hund e o Princípio de Pauli, analise as proposições:

I. A configuração anômala do Cr decorre da estabilidade especial associada a orbitais semi-preenchidos.
II. O elétron que ocupa o orbital 4s possui número quântico principal n = 4, azimutal $\ell = 0$ e spin ms = +½.
III. Um dos elétrons do subnível 3d possui n = 3, $\ell = 2$, ml = 0 e ms = –½.

IV. Se todos os elétrons 3d tivessem o mesmo spin, o Princípio da Exclusão de Pauli seria violado.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas II e IV estão corretas.
d) Apenas I, III e IV estão corretas.
e) Todas estão corretas.

3 (L.P_CZ1) Durante uma análise de propriedades periódicas, um candidato observou que o oxigênio (Z = 8) possui menor energia de ionização que o nitrogênio (Z = 7), embora esteja à sua direita no mesmo período.

Com base na estrutura eletrônica e na interação entre elétrons, qual explicação justifica corretamente essa anomalia?

a) O oxigênio apresenta um elétron desemparelhado adicional no orbital 2p, o que reduz a repulsão intereletrônica e aumenta sua energia de ionização.
b) O nitrogênio possui configuração $2p^3$ com orbitais semi-preenchidos, conferindo estabilidade adicional e elevando sua energia de ionização.
c) O oxigênio possui maior número de prótons, aumentando a atração nuclear e diminuindo sua tendência a perder elétrons.
d) A anomalia se deve à blindagem incompleta dos elétrons 1s, que é menor para o oxigênio do que para o nitrogênio.
e) O oxigênio, por estar em um grupo mais à direita, apresenta raio atômico maior e, portanto, menor energia de ionização.

GABARITO

Questão 1 – Resposta: letra b)

I — Correta. Thomson introduziu o modelo do "pudim de passas", reconhecendo elétrons incrustados em uma matriz positiva.
II — Correta. Rutherford introduziu o núcleo e a eletrosfera, mas o modelo previa colapso eletrônico segundo a física clássica.
III — Correta. Bohr introduziu níveis quantizados, solucionando a instabilidade e explicando o espectro do hidrogênio.
IV — Incorreta. O modelo quântico elimina trajetórias fixas, substituindo-as por orbitais de probabilidade descritos pela função de onda (Ψ).

Comentário CZ1:
A evolução dos modelos atômicos reflete a transição da física clássica para a mecânica quântica — de trajetórias determinísticas (Bohr) para distribuições probabilísticas (Schrödinger).

Questão 2 – Resposta: letra e)
I — Correta. A configuração $4s^1 3d^5$ resulta da estabilidade de orbitais semi-preenchidos, que reduzem a energia do sistema.
II — Correta. O elétron 4s possui n = 4, ℓ = 0 (subnível s), e spin +½ (preenchimento inicial).
III — Correta. Um elétron em 3d: n = 3, ℓ = 2, ml = 0, ms = –½ é permitido e consistente.
IV — Correta. Segundo Pauli, dois elétrons em um mesmo orbital não podem ter os quatro números quânticos idênticos; se todos os spins fossem iguais, haveria violação.

Comentário CZ1:
O cromo e o cobre apresentam exceções ao princípio de Aufbau devido à energia comparável entre os subníveis 4s e 3d e à estabilidade extra dos orbitais semi-preenchidos ou completamente preenchidos.

Questão 3 – Resposta: letra b)

Correta. O nitrogênio possui configuração $1s^2$ $2s^2$ $2p^3$, com três orbitais p semi-preenchidos (↑ ↑ ↑), o que gera máxima estabilidade segundo a regra de Hund.

O oxigênio ($2p^4$) tem um dos orbitais p com par de elétrons (↑↓), aumentando a repulsão intereletrônica e reduzindo a energia de ionização em relação ao N.

As demais alternativas incorrem em erros conceituais:

(a) contradiz a lógica da repulsão.

(c) maior carga nuclear tenderia a aumentar, não reduzir, a energia de ionização.

(d) blindagem 1s é idêntica para ambos.

(e) o raio do oxigênio é menor, não maior.

Comentário CZ1:

Essa exceção é clássica em provas da CESGRANRIO, pois exige compreender que repulsão entre elétrons emparelhados pode reduzir a energia de ionização mesmo quando o átomo está mais à direita no período.

charlene.hair@gmail.com
00412071061

Considerações Finais

Chegamos ao final de nossa jornada através dos conceitos fundamentais da estrutura atômica e da Tabela Periódica, tendo percorrido um caminho que nos levou desde as primeiras concepções atomísticas até a sofisticada compreensão moderna da organização eletrônica. Esta exploração revelou que a aparente complexidade da matéria emerge de princípios organizacionais elegantes e previsíveis.

A evolução dos modelos atômicos ilustrou como o conhecimento científico progride, com cada modelo superando as limitações do anterior enquanto preserva seus insights válidos. Do átomo indivisível de Dalton até a descrição probabilística quântica atual, testemunhamos a construção progressiva de uma compreensão cada vez mais refinada da realidade microscópica.

A distribuição eletrônica, governada por princípios quânticos precisos, emergiu como a chave mestra para compreender o comportamento químico. Os números quânticos, longe de serem abstrações matemáticas, revelaram-se as coordenadas fundamentais que determinam todas as propriedades da matéria.

A Tabela Periódica, por sua vez, demonstrou ser muito mais que uma ferramenta de organização. Ela representa um mapa detalhado das relações entre estrutura eletrônica e propriedades químicas, onde a posição espacial revela verdades fundamentais sobre o comportamento dos elementos. As propriedades periódicas completaram este quadro, mostrando como características aparentemente distintas seguem padrões interconectados e previsíveis.

Este conjunto de conhecimentos forma a base sólida sobre a qual se constrói toda a química moderna. A compreensão da estrutura atômica como alicerce para o comportamento químico e a Tabela Periódica como ferramenta essencial para prever as propriedades e reatividade dos elementos constituem pilares indispensáveis para qualquer estudo mais avançado da ciência dos materiais.

charlene.hair@gmail.com
00412071061